



1. **La somministrazione di farmaci per via enterale avviene attraverso**
 - a. Il tratto gastro-intestinale
 - b. Il torrente ematico
 - c. L'utilizzo di un catetere venoso centrale

2. **Secondo la classificazione N.P.U.A.P., a quale stadio si riferisce una lesione così descritta:
"Lesione cutanea a spessore totale con degenerazione o necrosi del tessuto sottocutaneo con possibile estensione fino alla fascia, ma che non si estende oltre."**
 - a. Stadio I
 - b. Stadio II
 - c. Stadio III

3. **La pleura è una membrana che riveste:**
 - a. Il cuore
 - b. I polmoni
 - c. I reni

4. **Quale dei seguenti muscoli è coinvolto nella respirazione?**
 - a. Tricipite
 - b. Quadricipite
 - c. Diaframma

5. **Quale dei seguenti principi attivi si riferisce ad un farmaco betabloccante?**
 - a. Bisoprololo
 - b. Furosemide
 - c. Edoxaban

6. **Le fiale di KCL devono essere conservate:**
 - a. A chiave nella cassaforte degli stupefacenti
 - b. In apposito contenitore, esclusivo, recante la scritta "ATTENZIONE: Mortale se infuso non diluito"
 - c. Nel cassetto dei farmaci per uso parenterale

7. **In un adulto a digiuno, sono ritenuti valori glicemici normali tra:**
 - a. 70 - 110 mg/dl
 - b. 90 - 150 mg/dl
 - c. 100 - 130 mg/dl

8. **Quale tra i seguenti può essere considerato un effetto collaterale della ventilazione non invasiva (NIV)?**
 - a. Gastrite
 - b. Insonnia
 - c. Decubiti nasali

9. Il calibro del catetere vescicale si misura in:

- a. Gauge
- b. mEq
- c. Charriere

10. Quale tra le seguenti scale è indicata per la valutazione del dolore?

- a. VIP
- b. VAS
- c. GCS

11. Quale tra i seguenti principi attivi è un oppioide?

- a. Ketorolac
- b. Desametasone
- c. Oxycodone

12. In un paziente con ileostomia le feci saranno:

- a. Acoliche
- b. Liquide
- c. Solide

13. Il corretto ordine delle fasi del Processo di Assistenza Infermieristica prevede:

- a. Raccolta dati, Diagnosi , Obiettivi , Definizione degli Interventi, Attuazione degli interventi, Valutazione
- b. Attuazione degli interventi, Raccolta Dati, Definizione degli interventi, Diagnosi, Obiettivi, Valutazione
- c. Valutazione, Diagnosi, Obiettivi, Raccolta Dati, Definizione degli interventi, Attuazione degli interventi.

14. La Glasgow Coma Scale (G.C.S.) è una scala basata su tre parametri:

- a. Apertura della bocca, risposta motoria, risposta palpebrale
- b. Apertura degli occhi, risposta verbale, risposta motoria
- c. Apertura degli occhi, risposta verbale, risposta non verbale

15. L'insulina è un ormone rilasciato:

- a. Dalle cellule beta del pancreas
- b. Dalle cellule alfa del pancreas
- c. Dalle cellule delta del pancreas

16. Il termine "ageusia" definisce:

- a. Un'alterazione dell'osmolarità sierica
- b. Una riduzione o perdita del gusto
- c. Una riduzione o perdita dell'olfatto

17. Quante compresse da 0.125 mg si devono somministrare per ottenere 0.25 mg di dosaggio?

- a. Mezza compressa
- b. 2 compresse
- c. 5 compresse



18. In ambito infermieristico, l'acronimo F.A.N.S. indica:

- a. Farmaci anti-infiammatori non steroidei
- b. Farmaci anti-dolorifici non steroidei
- c. Farmaci ancora non sospesi

19. L'iscrizione all'OPI è obbligatoria ai fini dell'esercizio professionale?

- a. Solo per gli infermieri della sanità pubblica
- b. Sì, per tutti gli infermieri
- c. Solo per gli infermieri della sanità privata o libero professionisti

20. Per "stranguria" si intende:

- a. Alzarsi di notte per urinare
- b. Urinare oltre i 2000 ml nelle 24 ore
- c. Emissione di urina dolorosa e intermittente

21. Quale tra i seguenti principi attivi è un anticoagulante:

- a. Ramipril
- b. Warfarin
- c. Bisoprololo

22. Il tracciato dell'elettrocardiogramma rappresenta:

- a. L'attività elettrica del cuore
- b. L'attività elettrica dell'encefalo
- c. L'apertura delle valvole atrio-ventricolari

23. Al fine di prevenire il delirio nella persona anziana può essere utile:

- a. Predisporre il sistema di chiamata (campanello) in modo che sia facilmente raggiungibile
- b. Rimuovere apparecchi acustici, occhiali e altri presidi dell'assistito
- c. Chiedere a parenti e familiari di non sostare nella stanza di degenza

24. La scala di Braden:

- a. Il punteggio può variare da 0 a 100
- b. E' composta dai seguenti item: Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
- c. E' composta dai seguenti item: Storia di cadute, diagnosi secondarie, aiuto negli spostamenti, terapia endovenosa, passo e trasferimenti, stato mentale

25. La frequenza respiratoria in un paziente adulto sano è fisiologicamente:

- a. Compresa tra 5 e 15 atti respiratori al minuto
- b. Compresa tra 6 e 23 atti respiratori al minuto
- c. Compresa tra 12 e 20 atti respiratori al minuto

26. Quali delle seguenti scale valuta il rischio di sviluppare lesioni da pressione?

- a. NRS
- b. Morse
- c. Braden

27. Quali sono i range di valori al di sotto e al di sopra dei quali si parla, rispettivamente, di bradicardia e tachicardia?

- a. < 60 bpm; > 100 bpm
- b. < 55 bpm; > 90 bpm
- c. < 70 bpm; > 110 bpm

28. In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con un'angolazione di 10-15 gradi?

- a. Iniezione intramuscolare
- b. Iniezione intradermica
- c. Iniezione sottocutanea

29. Una lesione da decubito al primo stadio prevede:

- a. Un eritema che scompare alla digitopressione
- b. La rimozione dell'epidermide ma non del derma
- c. Un eritema che persiste alla digitopressione

30. Un Body Mass Index (BMI) di 29,8 kg/m² indica:

- a. Sovrappeso
- b. Obesità di I grado
- c. Obesità di II grado