



PROVA SCRITTA 4

- 1) **Il dolo si caratterizza per:**
 - A. La volontarietà della condotta
 - B. La non volontarietà della condotta
 - C. L'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

- 2) **Indicare cosa differenzia una pomata da una crema:**
 - A. La diversa percentuale di acqua e base grassa
 - B. La modalità d'uso
 - C. La diversa percentuale di principio attivo

- 3) **Indicare le caratteristiche tipiche del dolore durante un infarto miocardico:**
 - A. Parasternale, sordo, puntorio, irradiato verso il capo/il collo/le braccia/le mani, intensità dipendente dal respiro, durata superiore alle 24 ore
 - B. Retrosternale, di tipo costrittivo o oppressivo, irradiato verso il collo/la mandibola/le braccia/il dorso/l'epigastrio, concomitante nausea/vomito, sudorazione, di forte intensità, di durata superiore ai 15 - 20 minuti
 - C. Toracico, intermittente, irradiato al braccio sinistro, intensità medio alta, di durata 15 -20 minuti

- 4) **Prima di somministrare la terapia digitalica, quale dei seguenti parametri occorre controllare?**
 - A. Frequenza respiratoria
 - B. Frequenza cardiaca
 - C. Diuresi

- 5) **Indicare quale intervento di assistenza infermieristica durante l'immediato periodo post – operatorio è ERRATO:**
 - A. Applicare un catetere uretro-vescicale se il paziente accusa dolore addominale
 - B. Controllare i parametri vitali e riconoscere i segni precoci di shock o emorragia
 - C. Assicurare la pervietà delle vie aeree e una normale funzionalità respiratoria

- 6) **Il monitoraggio neurologico secondo la Glasgow Coma Scale (GCS) , si basa sulla valutazione di:**
 - A. Riposte motorie, risposte verbali e apertura degli occhi
 - B. Pressione intracranica (PIC) e pressione arteriosa polmonare
 - C. Diametro pupillare, riflesso fotomotore e tipo di respiro

- 7) **La rachicentesi consiste in una procedura che consente di:**
 - A. Prelevare midollo osseo
 - B. Prelevare liquido cefalo-rachidiano
 - C. Prelevare midollo spinale

8) La scala di BRADEN è :

- A. Uno strumento per individuare i pazienti a rischio di lesioni cutanee da pressione
- B. Uno strumento per la stadiazione delle ustioni
- C. Uno strumento per individuare il rischio di cadute

9) Il respiro di Kussmaul si verifica nel caso di:

- A. Alterazioni dismetaboliche
- B. Lesioni cerebrali
- C. Broncopolmonite

10) Indicare quale posizione facilita l'inserimento di un CVC (Catetere Venoso Centrale) in vena giugulare:

- A. Trendelenburg
- B. Antitrendellenburg
- C. Fowler

11) Le eparine a basso peso molecolare vengono somministrate per via:

- A. Intramuscolare
- B. Endovenosa
- C. Sottocutanea

12) In caso di stravaso di un farmaco antitumorale, è necessario provvedere immediatamente a:

- A. Sospendere immediatamente l'infusione
- B. Somministrare l'antidoto
- C. Procedere a lavaggio con soluzione fisiologica

13) Si definisce "reazione avversa a un farmaco" un effetto:

- A. Farmacologico dovuto a errore nella prescrizione del farmaco
- B. Farmacologico dovuto a errore nella somministrazione del farmaco
- C. Nocivo e non intenzionale del farmaco somministrato alle dosi normali

14) Indicare la norma che definisce il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere:

- A. D.M. 739/1994
- B. Legge 251/2000
- C. Legge 42/1999

15) Nell'ambito della valutazione dell'assistenza infermieristica il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti esprime:

- A. Appropriatelyzza
- B. Efficienza
- C. Efficacia



- 16) L'infermiere ha realizzato un intervento educativo pre-dimissione ad un caregiver di un paziente che riporta un'emisindrome destra. L'intervento educativo sarà stato efficace se il caregiver risponde come segue:
- A. "Dovrò garantirgli un ambiente sicuro, proteggendolo dalle situazioni che non può riconoscere a causa della deprivazione sensoriale, evitare che si interessi del lato colpito con il rischio di demoralizzarsi"
 - B. "Riassumendo quello che mi ha detto: dovrò garantirgli un ambiente sicuro, proteggendolo dalle situazioni che non può riconoscere a causa della deprivazione sensoriale, aiutarlo nel riconoscere i deficit, stimolarlo gradualmente ad interessarsi alla parte colpita"
 - C. "Grazie infermiere, è stato gentilissimo ed ho compreso quanto mi ha illustrato. La ringrazio per la disponibilità e non mancherò di contattarla se dovessi avere dubbi."
- 17) Il trasporto di un paziente con trauma della colonna vertebrale deve essere eseguito in posizione:
- A. Supina con testa e collo iperestesi
 - B. Supina con testa e collo immobilizzati
 - C. Ortopoica con testa e collo immobilizzati
- 18) Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche, deve avvenire:
- A. Dopo aver camminato
 - B. Prima di alzarsi dal letto al mattino
 - C. Tutte le volte che sente le gambe appesantite
- 19) La pressione arteriosa diastolica di un adulto è compresa nei seguenti range di normalità:
- A. 100-140 mmHg
 - B. 70-90 mmHg
 - C. 90-110 mmHg
- 20) Per "bilancio idrico" si intende:
- A. La valutazione dei liquidi introdotti per via endovenosa ed eliminati per via urinaria in 24 ore
 - B. Il calcolo di tutti liquidi introdotti ed eliminati nelle 24 ore
 - C. La valutazione dei liquidi introdotti per via orale ed eliminati per via urinaria nelle 24 ore

PROVA NON
ESTRATTA

[Handwritten signature]

