

PROVA NON ESTRATTA



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 20 CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE (CAT.D)

**PROVA SCRITTA N. 2**

**27/06/2022**

**1) Il detergente è una sostanza chimica che**

- A. impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni
- B. favorisce la disinfezione senza ridurre la carica batterica
- C. diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco

**2) Il rischio clinico può essere definito come:**

- A. La probabilità dell'infermiere di commettere un errore durante la pratica clinica
- B. La probabilità del paziente di essere vittima di un evento avverso
- C. La probabilità del paziente di non guarire dall'evento clinico

**3) Indicare quali tra i seguenti sono segni/sintomi di shock:**

- A. Ipertensione, tachicardia, oliguria
- B. Tachicardia, ipotensione, oliguria
- C. Ipotensione, bradicardia, disuria

**4) La sarcopenia è un processo che si verifica:**

- A. Nell'anziano
- B. Nel paziente immunodepresso
- C. Nel paziente affetto da aritmie

**5) Secondo la Classificazione NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel), una lesione da pressione di grado 4 presenta:**

- A. Eritema non riducibile con cute integra
- B. Perdita parziale di sostanza a carico della cute che interessa l'epidermide e/o il derma
- C. Perdita cutanea a tutto spessore con vasta distruzione, necrosi tissutale o con danno esteso al muscolo, all'osso o ad altre strutture sottostanti

**6) Indicare quale delle seguenti caratteristiche è tipica di un paziente con ileostomia:**

- A. Vengono prodotte feci liquide e continue che non possono essere controllate
- B. Vengono prodotte feci normali e consistenti
- C. L'eliminazione può essere controllata

**7) In caso di severa ipoglicemia con perdita di coscienza quale farmaco viene utilizzato?**

- A. Adrenalina per via endovenosa
- B. Glucagone per via intramuscolare
- C. Atropina per via sottocutanea

**8) Durante l'inserimento del sondino nasogastrico il paziente deve essere istruito a:**

- A. Assumere la posizione supina e tossire al passaggio del sondino
- B. Tenere il capo inclinato in avanti e deglutire al passaggio del sondino
- C. Tenere il capo esteso all'indietro e deglutire al passaggio del sondino

**9) Il tempo minimo d'azione dello iodopovidone (es Betadine) è:**

- A. 2-5 secondi
- B. 20-30 secondi
- C. 90-120 secondi

**10) "Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile" è la definizione di:**

- A. Evento avverso
- B. Near-miss
- C. Evento sentinella

**11) Un movimento oscillatorio, anomalo e involontario dei globi oculari prende il nome di:**

- A. Nistagmo
- B. Atassia
- C. Bruxismo

**12) Indicare quale tra le seguenti affermazioni circa l'utilizzo dei guanti è FALSA:**

- A. Alla rimozione dei guanti occorre sempre effettuare l'igiene delle mani
- B. L'utilizzo dei guanti non sostituisce l'esigenza di procedere con l'igiene delle mani
- C. L'uso dei guanti è la misura più efficace nella riduzione del rischio di trasmissione delle infezioni da un paziente all'altro

**13) Nell'accertamento del paziente cardiopatico scompensato si valuta soprattutto la presenza di:**

- A. Episodi di ipotensione ortostatica
- B. Poliuria
- C. Edemi declivi e turgore delle vene giugulari

**14) Il Codice Deontologico degli Infermieri viene emanato da:**

- A. Ministero della Salute
- B. Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche
- C. Associazioni di categoria

**15) L'adeguata cura del piede diabetico NON comprende:**

- A. Frequente utilizzo di antisettici locali
- B. Utilizzo di calzature comode
- C. Mantenimento dell'idratazione cutanea

**16) Le piastre adesive del DAE devono essere posizionate:**

- A. Sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare destra e tra le linee ascellari media e anteriore sinistra
- B. Sulla spalla del paziente per non interferire con la Rianimazione Cardio Polmonare
- C. Sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare sinistra e tra le linee ascellari media e anteriore destra

**17) Suddividendo l'addome in 9 quadranti, dove si colloca la colecisti?**

- A. Ipocondrio destro
- B. Fossa iliaca sinistra
- C. Ipocondrio sinistro

**18) Le fiale di KCL devono essere conservate:**

- A. Assieme ai farmaci per uso parenterale
- B. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco pericoloso, da diluire prima dell'uso"
- C. Chiuse a chiave nella cassaforte degli "Stupefacenti"

**19) In caso di ostruzione parziale delle vie aeree la manovra di Heimlich:**

- A. Non deve essere praticata
- B. Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza
- C. Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente

**20) A chi è rivolta la prevenzione primaria?**

- A. Soggetto sano
- B. Soggetto sintomatico
- C. Soggetto malato

**21) Per disinfezione si intende:**

- A. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- B. Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti
- C. Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi

22) Giunge in Pronto Soccorso un paziente di 18 anni che riferisce nelle ultime due settimane polidipsia, poliuria, polifagia e perdita di peso > 20% negli ultimi 2 mesi. Quale intervento infermieristico occorre mettere in atto nell'immediato?

A. Rilevazione di glicemia capillare, nel sospetto di un diabete mellito di tipo I

B. Rilevazione di glicemia capillare, nel sospetto di un diabete mellito di tipo II

C. Rilevazione della pressione arteriosa e valutazione dell'eventuale presenza di edemi declivi, nel sospetto di uno scompenso cardiaco

23) Un collega racconta com'è organizzato il lavoro nell'Unità Operativa in cui è stato assegnato:

*"Sono Infermiere di StrokeUnit e lavoro in questo modo: accolgo e accerto i bisogni dei pazienti affidati. Alle 8.00 inizio le terapie mentre l'OSS distribuisce la colazione ai 10 pazienti. Quindi, l'OSS assieme ad un suo collega, effettuano l'igiene dei pazienti mentre io procedo con il giro visita del medico."*

Identifica il modello organizzativo prevalente che l'infermiere adotta nella sua pratica:

A. Team Nursing

B. Modello funzionale (Per compiti)

C. Primary Nursing

24) La clorexidina è

A. un antibiotico

B. un disinfettante

C. un agente sterilizzante

25) La valutazione della funzione fisica e dell'autonomia del paziente nelle attività quotidiane può essere effettuata tramite l'utilizzo della seguente scala:

A. Conley

B. Barthel

C. Norton

**26) In caso di severa ipoglicemia con perdita di coscienza quale farmaco viene utilizzato?**

- A. Adrenalina per via endovenosa
- B. Glucagone per via intramuscolare
- C. Atropina per via sottocutanea

**27) Per DPI si intende**

- A. Dispositivo personale
- B. Dispositivo prevenzione individuale
- C. Dispositivo protezione individuale

**28) Indicare quale tra le seguenti scale viene comunemente utilizzata per valutare il rischio globale di malnutrizione:**

- A. Bristol
- B. MUST
- C. Barthel

**29) Prima di somministrare la terapia digitalica, quale dei seguenti parametri occorre controllare?**

- A. Frequenza respiratoria
- B. Frequenza cardiaca
- C. Diuresi

**30) Per "bilancio idrico" si intende:**

- A. La valutazione dei liquidi introdotti per via endovenosa ed eliminati per via urinaria in 24 ore
- B. Il calcolo di tutti liquidi introdotti ed eliminati nelle 24 ore
- C. La valutazione dei liquidi introdotti per via orale ed eliminati per via urinaria nelle 24 ore